




Arzneimittellehre

Vokabeln Arzneimittellehre



Zusammensetzung Lokalthérapeutika



Darreichungsformen



Beipackzettel

Aufbau Beipackzettel:

- Indikationen**
- Anwendungshinweise: Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen, Schwangerschaftshinweis**
- Anwendung: Dosierung, Anwendungsart, Anwendungsdauer**
- mögliche Nebenwirkungen**
- Aufbewahrung, Entsorgung**
- Packungsinhalt**

Alternative Medikamente:

- Aspirin Plus C: ASS Plus C-CT, ASS Plus C-ratiopharm**
- MST continuus 10 mg: Morphin Hexal 10 mg Retardkapseln, Morphinsulfat - CT 10 mg Retardtabletten**
- Digimerck minor 0,07 mg: Digimed 0,07 mg, Digitoxin 0,07 mg AWD**

Medikamentenwirkung

Pharmakodynamik:

dazu gehören alle biochemischen Prozesse durch die ein Medikament im Körper wirkt.

Angriffspunkte an denen ein Medikament wirkt:

- Wirkung an Fremdorganismen z.B. Medikament greift Bakterien an (Antibiotikum)
- extrazelluläre Wirkung z.B. Laxantien, weil sie Wasser im Darm zurückhalten
- zelluläre Wirkung auf Membranproteine, Zellskelettproteine, Enzyme oder DNA der Zelle, z.B. ACE-Hemmer hemmen das Angiotensin-converting Enzym eine Reaktionskaskade und senken dadurch den Blutdruck

Wechselwirkungen von Medikamenten



Die Milch gerinnt/flockt aus, da die Zitronensäure die Proteine der Milch denaturiert.

Übertragen auf den Pflegealltag: je nach Medikamentenbestandteil kann es zur Zersetzung kommen, wenn es mit bestimmten Nahrungsmitteln eingenommen wird. Deshalb ist der Hinweis auf dem Beipackzettel zu

Wechselwirkungen wichtig.

Medikamente richten

| Ansetzdatum Arzt | Medikament | Einzeldosis/ Einheit | Einnahme | | | | Darreichungs- form | Bemerkungen/ Hinweise |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------|--------|--------|-----------------------|---|
| | | | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | | |
| 31.01.2017 MLW | Buscopan | 10 mg | 1 | - | - | - | Dragees | |
| 31.01.2017 MLW | Posiformin | 1 Strang | 1 | 1 | 1 | - | Augensalbe | Nach den Mahlzeiten |
| 31.01.2017 MLW | Ampho- Moronal | 100 mg | 1 | - | - | - | Tabletten | |
| 31.01.2017 MLW | L-Thyrox Hexal | 150 µg | 1 | - | - | - | Tabletten | Nüchtern, 30 Min. vor dem Frühstück |
| 31.01.2017 MLW | Livocab direkt | 1 Tropfen | 1 | 1 | 1 | - | Augentropfen | Vor dem Essen |
| 31.01.2017 MLW | MCP- ratiopharm 4mg/ml | 20 Tropfen | 1 | 1 | 1 | - | Tropfen | 30 Min vor dem Essen |
| 31.01.2017 MLW | Coraspin | 100 mg | - | 1 | - | - | Tabletten | |
| 31.01.2017 MLW | Dolo Visano | 750 mg | - | - | - | 1 | Tabletten | |